

Resumen de las reuniones del Comité Técnico de Expertos en Vacunación durante 2007

Consejo Nacional de Vacunación
México

Vacuna	Recomendación
Hepatitis B	<p>Recién nacidos Tres dosis, 0, 2 y 6 m La primera dosis será antes de cumplir las primeras 12 horas de vida, <i>antes de su egreso hospitalario, de preferencia en los primeros 7 días</i></p> <p>Niños con peso menor de 2 Kg. Se vacunaran al nacer, la cual no se cuenta como esquema y luego a los 2, 4 y 6 meses que son las que contarán como esquema Niños que no reciban su dosis en los primeros 7 días de vida, iniciaran su esquema a los 2, 4 y 6 meses</p> <p>Adolescentes Tres dosis de 10µg : 0, 2 y 6 meses a partir de la primera dosis ó Dos dosis de 20 µg: 0 y 1 mes</p>

Vacuna	Recomendación
Antineumocócica 23valente en adultos	Personas de 65 años de edad y más Dosis única No revacunar 60 años y más con depresión inmunológica o enfermedades crónicas Una sola revacunación, cinco años después de la vacunación inicial
Vacunación contra influenza en adultos	Aplicación de una sola dosis al 100% de la población de 60 y más años de edad , así como los de riesgo de 50 a 59 años

Vacuna

Recomendación

Doble viral contra el Sarampión y la Rubéola (SR)

SRP: Al año de edad y a los 6-7 años.
SR: Refuerzo a los 12 años de edad (sexto de primaria)
Debe contarse cuando menos con un refuerzo de SR entre los 13 y 39 años de edad
Campaña de eliminación de rubéola y síndrome de rubéola congénita: 19 a 29 años de edad, en marzo de 2008
Se debe fortalecer el sistema de Vigilancia de SRC para verificar si los casos de rubéola en menores de 1 año corresponden a SRC.

Rotavirus: Seguridad

Los casos de invaginación intestinal reportados son poco frecuentes y no superan las cifras basales reportadas
Continuar aplicando la vacuna monovalente contra rotavirus
Vigilancia activa de los casos de invaginación intestinal, en todo el sector salud

Vacuna	Recomendación
Antihepatitis A	<ol style="list-style-type: none">1. Grupos de riesgo:<ul style="list-style-type: none">✓ Niños jornaleros que trabajan en los campos y en los empaques, en zonas que utilizan aguas residuales para riego: 1 a 8 años de edad✓ Niños de las estancias y de guarderías: 1 a 3 años2. Se deberán realizar estudios de costo/efectividad que nos permita el análisis y la de decisión de la incorporación de la vacunas a los esquemas nacionales durante 2009

Vacuna	Recomendación
Antipoliomielítica	<p>VPI (Pentavalente acelular: DPaT+Hib+VPI) A los 2, 4, 6 y 18 meses de edad</p> <p>VPO</p> <p>En Semanas Nacionales de Salud, Para menores de 5 años de edad Deben contar con dos dosis previas de VPI</p> <p>En cercos epidemiológicos por PFA</p> <p>.</p>

Recomendaciones en casos de desastre

” Albergues:

- **Completar esquemas de vacunación** en todas las edades, con énfasis en **sarampión (SR)** y **tétanos (Td)**
- Vacunación contra **influenza**, de manera universal, cuando sea temporada invernal
- Vacunar contra **hepatitis A**, a partir del año de edad hasta los 10 años, dependiendo de la serología de cada región.